DOTT. SALVATORE DI GIACINTO

Medico - Chirurgo SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA

Dirigente Medico SOC Ortopedia e Traumatologia pediatrica

Ospedale pediatrico Meyer Azienda Ospedaliero-Universitaria

Iscrizione Ordine dei Medici di Firenze nº 13797

Libera Professione:





Viale Manfredo Fanti, 49A Tel.: 055 685789





Viale G. Matteotti, 4 Tel.: <u>055 50975</u> (Interventi chirurgici in LP)



Via Geminiano Inghirami, 19 Tel: <u>0574 560913</u>





Via Montarioso, 9/A Tel.: <u>0577 588345</u>

Grosseto



Via Birmania, /2// Tel.: <u>0564 462045</u>

Follonica (GR)



Via del Sugheraio, 77 Tel.: <u>366 6298028</u>

Marcianise (CE)

Studio Medico

dott. Salvatore
Di Giacinto

Via Catena, 23 (già 7) Tel.: <u>0823 832882</u>

Info

www.salvatoredigiacinto.it

I "DOLORI DELLA CRESCITA" DEI BAMBINI. COSA SONO E COSA FARE?



Una delle più frequenti preoccupazioni dei genitori con bambini dai 2 ai 10 anni (10-20% circa dei bambini) sono i dolori alle gambe, che gli stessi figli riferiscono. Questi dolori hanno caratteristiche tipiche: si presentano la sera o durante le prime ore del sonno. Sono spesso riferiti al ginocchio, ma mai in un punto specifico. Sono dolori dall'insorgenza parossistica: iniziano improvvisamente, sono così acuti tanto da svegliare il bambino e farlo piangere, poi altrettanto rapidamente svaniscono. Possono durare per qualche giorno, poi divenire muti per ripresentarsi a distanza di settimane o addirittura mesi. Non sono mai invalidanti per il bambino e non lasciano conseguenze funzionali o di dolore il giorno dopo. Nonostante il nome, non vi è alcuna chiara evidenza scientifica che suggerisca una correlazione tra i dolori della crescita e la crescita delle ossa del bambino. Questo è il motivo per cui alcuni medici preferiscono utilizzare la definizione di "dolore ricorrente notturno agli arti nei bambini".

Sintomi

I dolori della crescita di solito causano un dolore o una sensazione crampiforme alle gambe. Questo dolore si verifica spesso nella parte anteriore delle cosce, ai polpacci e dietro le ginocchia. Solitamente entrambe le gambe fanno male. Alcuni bambini possono anche

DOTT. SALVATORE DI GIACINTO

Medico - Chirurgo SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA

Dirigente Medico SOC Ortopedia e Traumatologia pediatrica Ospedale pediatrico Meyer Azienda Ospedaliero-Universitaria

Iscrizione Ordine dei Medici di Firenze nº 13797

Libera Professione:







Via Geminiano Inghirami, 19 Tel: <u>0574 560913</u>





Via Montarioso, 9/A Tel.: 0577 588345

Grosseto



Tel.: 0564 462045

Follonica (GR)



Tel.: 366 6298028

Marcianise (CE)

Studio Medico dott. Salvatore Di Giacinto Via Catena, 23 (già 7) Tel.: 0823 832882

www.salvatoredigiacinto.it

provare dolore addominale o mal di testa durante gli episodi di dolori della crescita. Il dolore non si verifica ogni giorno e in genere va e viene, è saltuario. I dolori della crescita spesso colpiscono nel tardo pomeriggio o in prima serata e scompaiono al mattino. A volte il dolore insorge la notte e risveglia un bambino nel mezzo del sonno. I dolori della crescita sono avvertiti come dolori intensi simili a crampi in entrambe le gambe. Essi influenzano il più delle volte i polpacci e le caviglie, ma possono colpire anche le cosce.

Cause

La causa dei dolori della crescita è sconosciuta. Non ci sono prove che la crescita di un bambino sia dolorosa. Inoltre i dolori della crescita di solito non si manifestano nei periodi in cui sta avvenendo la crescita né tantomeno durante i periodi di rapida crescita.

Quando dovete consultare un medico?

Consultate il vostro Medico di famialia o il vostro Pediatra se il dolore del vostro bambino è:

persistente;

sempre presente al mattino;

abbastanza grave da interferire con le normali attività del vostro bambino;

manifesto anche in altre articolazioni;

associato con un infortunio;

accompagnato da altri segni o sintomi, come gonfiore, rossore, malessere, febbre, zoppìa, eruzioni cutanee, perdita di appetito, debolezza o stanchezza;

migrante: cioè interessa varie articolazioni migrando dall'una all'altra; presente alle articolazioni ed è correlato con una faringo-tonsillite.